

# ОСТОРОЖНО!

## Сибирская язва: памятка для животноводов




### МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ для владельцев животных:

- Обязательное взаимодействие с ветеринарными специалистами:
- предоставление животных для проведения клинического осмотра, вакцинации
  - информирование о вновь приобретенных животных
  - проведение карантина для вновь приобретенных животных с целью исследований и вакцинаций
  - проведение покупки, продажи, сдачи на убой, всех других перемещений животных, реализации животноводческой продукции только с разрешения государственной ветеринарной службы
  - экстренное сообщение о случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животных

**ВНИМАНИЕ!** Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо.

**ВСКРЫТИЕ ТРУПОВ** животных при подозрении на заболевание сибирской язвой **ЗАПРЕЩЕНО!**

**ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ**  
в Брянской области 8 (4832) 41-09-63, 41-09-67, в Калужской области – 8 (4842) 59-17-85, 79-92-43, в Смоленской области – 8 (4812) 64-22-92. 65-36-74



**Сибирская язва** - особо опасное заболевание человека и многих видов животных, характеризующееся поражением кожи, кишечника, легких, лимфатических узлов и высокой смертностью **Возбудитель** - спорообразующая бактерия, устойчивая к физико-химическим воздействиям, которая может сохраняться во внешней среде столетиями

**Источник возбудителя** больные животные, их жскременты (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий), а также зараженные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней среды

**Инкубационный период** может быть от нескольких часов до 8 дней, чаще он составляет 2-3 дня

**Основной путь заражения**

у животных - через корма и воду, а также через укусы насекомых и органы дыхания, у человека при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки туш, при хранении, транспортировке

**ВНИМАНИЕ!** Употребление крови и мяса животных в период неблагоприятной обстановки по СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ не допускается!

В зависимости от путей заражения у человека развивается **КОЖНАЯ, КИШЕЧНАЯ, ЛЕГОЧНАЯ** формы сибирской язвы:

#### КОЖНАЯ ФОРМА

Летальность  
10- 20%

Покраснения, переходящие в черный с труп, а затем - в безболезненную язву  
Высокая температура  
Головная боль  
Слабость

#### КИШЕЧНАЯ ФОРМА



Тошнота  
Рвота с кровью  
Кровавый понос  
Боли в животе и пояснице

#### ЛЁГОЧНАЯ ФОРМА



Боли в груди  
Кашель со слизистой мокротой, затем с кровью